



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФЛЮЦИД® INFLUCID®

Торговое название препарата: Инфлюцид®

Состав:

1 таблетка содержит:

активные вещества: Aconitum D3 - 25 мг, Gelsemium D3 - 25 мг, Ipescacuanha D3 - 25 мг, Phosphorus D5 - 25 мг, Bryonia D2 - 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 - 25 мг.

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный.

Описание: таблетки белого или почти белого цвета, двухплоскостные с фаской, допускаются небольшие вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатические средства.

Код АТХ: R05X

Фармакологические свойства

Гомеопатическая терапия явно отличается от традиционной медицины в отношении понимания заболевания и использования лекарственных субстанций. Гомеопатические средства стимулируют защитные силы самого организма и активируют таким образом его потенциал самоизлечения. Ответ организма на гомеопатическое средство строго индивидуален. По этой причине дозоспецифические фармакологические эффекты, фармакодинамические или фармакокинетические данные не могут быть определены.

Показания к применению

Лечение и профилактика лихорадочных гриппоподобных инфекций и других острых вирусных инфекций верхних дыхательных путей. Поддерживающее лечение гриппа.

Способ применения и дозы

Режим дозирования

Взрослые: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для *профилактики* инфекций принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Педиатрическая группа

Дети от 1 до 11 лет: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждые 2 часа, но не более 8 таблеток в день, до улучшения симптомов. При *последующем лечении* принимают по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети с 12 лет и старше: при *острых состояниях*, принимают по 1 таблетке каждый час, но не более 12 таблеток в день, до облегчения симптомов. Для *последующего лечения* принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Для *профилактики* инфекций дети до 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день, а дети с 12 лет и старше принимают по 1-2 таблетки 3 раза в день.

Способ применения

Таблетки следует принимать за 30 минут до или через 30 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. Маленьким детям можно измельчить таблетки и растворить их в небольшом количестве воды.

Побочные действия

Очень редкие (<1/10,000) или неизвестные (частота не может быть оценена на основе имеющихся данных):

Реакции гиперчувствительности, например сыпь на коже и желудочно-кишечные расстройства. В этих случаях, прием Инфлюцида следует прекратить и обратиться к врачу.

Примечание: при применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Препарат нельзя применять при известной гиперчувствительности к *Eupatorium perfoliatum* (посконнику пронзеннолистному) либо другим членам семейства сложноцветных, другим активным или вспомогательным веществам.

Лекарственные взаимодействия

Взаимодействия с другими лекарственными средствами не известны.

Особые указания

Препарат содержит лактозу и пшеничный крахмал. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции не следует применять препарат. Пшеничный крахмал может содержать глютен, но только в следовых количествах, и поэтому безопасен для людей с целиакией. Пациентам с аллергией на пшеницу (отличается от целиакии) не стоит принимать этот препарат.

Дети

Инфлюцид нельзя применять детям младше 1 года, поскольку применение препарата недостаточно задокументировано в этой возрастной группе.

Проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом в случае:

- Если симптомы не улучшаются или ухудшаются,
- Если появляются дополнительные жалобы,
- Если температура тела удерживается или повышается свыше 39 °C.

Применение в период беременности или кормления грудью.

Как и все лекарственные препараты, в период беременности или кормления грудью Инфлюцид следует принимать только после предварительной консультации врача.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Лечение гомеопатическими препаратами не исключает применения других лекарственных средств.

В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Препарат следует хранить в не доступном для детей месте и не применять после истечения срока годности.

Передозировка

Не установлена.

Форма выпуска

Таблетки по 250 мг, 20 таблеток в блистере; по 3 блистера в картонной коробке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Срок годности

5 лет.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе 24
Тел. +49 (721) 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Germany, Karlsruhe 76227, Ottostrasse 24
Tel. +49 (721) 40 93 236